

Composición: tialoprid 48% p/v (480 g/l)
Formulación: Suspensión concentrada (SC)
Presentación: Frascos de 100 cc y 1 l.

Características

Calypso es un insecticida que pertenece al grupo químico de los cloronicotinilos. Actúa por contacto e ingestión y presenta una elevada actividad residual y excelentes propiedades sistémicas.

Usos autorizados

Tratamientos insecticidas en cultivos de:

Peral y manzano, contra carpocapsa, pulgones y psila del peral.
Melocotonero y albaricoquero, contra polilla oriental y pulgones.

Algodonero, berenjena, calabacín, melón, pepino, pimiento, sandía, tomate y ornamentales herbáceas, contra mosca blanca y pulgones.

Patata, contra escarabajo y pulgones.

Dosis y modo de empleo

Aplicar en pulverización normal a la dosis del:

0,025% - 0,03% en peral y manzano, efectuando como máximo 2 tratamientos espaciados 14 días con un máximo de 0,375 l/ha por aplicación.

0,02% en melocotonero y albaricoquero, efectuando como máximo 2 tratamientos espaciados 14 días con un máximo de 0,3 l/ha por aplicación.

0,02% contra pulgones y 0,03% contra mosca blanca en las hortalizas autorizadas y ornamentales herbáceas, efectuando como máximo 3 aplicaciones espaciadas 7 - 14 días con un máximo de 0,3 l/ha por aplicación en melón y sandía y de 0,45



l/ha por aplicación en el resto.

0,2 l/ha en algodónero y patata, efectuando como máximo 3 aplicaciones espaciadas 14 - 21 días.

Plazo de seguridad

Entre el último tratamiento y la recolección:

3 días en las hortalizas autorizadas.

14 días en los frutales autorizados.

21 días en algodónero y patata.

Clasificación Toxicológica				
General	Mamíferos	Aves	Peces	Abejas
Noctuo (0a)				

Nº de Registro: 22.718