

Composición: deltametrina 2,5 % p/v (25 g/l).
Formulación: Concentrado emulsionable (EC).
Presentación: Frascos de 250 cc y 1 l, garrafas de 5 l y bidón de 25 l.


Características

Decis es un insecticida piretroide, que actúa por contacto e ingestión, con un gran efecto de choque. Adicionalmente posee efecto repelente y antiapetencia.

Usos autorizados

Tratamientos insecticidas en cultivos de:

- Frutales de hueso y pepita**, contra orugas, pulgones, carpocapsa, hoplocampa, antonómo, anarsia, zeuzera y psilidos.
- Citricos**, contra pulgones y polillas.
- Higuera**, contra orugas y pulgones.
- Vid**, contra polillas del racimo y piral.
- Olivo**, contra prays (g. antofaga), mosca y glífodos.
- Alcachofa, colza, cucurbitáceas, escarola, espinaca y similar, girasol, brassicas, lechuga, leguminosas verdes y de grano, lúpulo, puerro, tabaco y hierbas aromáticas**, contra orugas y pulgones.
- Algodonero**, contra gusano rosado, heliotis, pulgones y trips.
- Alfalfa**, contra gusano verde, gusanos grises, cuca y pulgones.
- Cereales**, contra pulgones y garapatillo.
- Hortalizas de bulbo**, contra pulgones y trips.
- Maíz**, contra pulgones, heliotis, gusanos grises y taladros.
- Melón**, contra galeruca y vacanita.
- Patata**, contra orugas, pulgones y escarabajo.
- Remolacha**, contra orugas, pulgones y pulguilla.
- Solanáceas**, contra orugas, pulgones, heliotis y trips.
- Champiñón**, contra moscas y mosquitos.
- Platanos de sombra**, contra cortiça.
- Pinos**, contra procesionaria, escoltidos y pisodes.
- Arbustos y herbáceas ornamentales**, contra orugas, pulgones,



gusanos grises, mosca blanca, heliotis y trips.

Dosis y modo de empleo

Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,03-0,05 %.
En la mosca del olivo tratar en bandas con una solución de 0,5 l de producto y 2,5 l de proteína hidrolizable por cada 100 l de agua, usando 20 l/va de este caldo.
En pinares aplicar del 0,1-0,2 % en tratamientos localizados.
En champiñón, aplicar a la dosis normal con un consumo de caldo de 50-100 l/m² de área de cultivo, usando 2/3 del caldo en el cultivo y el resto en el local.

Plazo de seguridad

Entre el último tratamiento y la recolección:

- 3 días en cucurbitáceas, leguminosas, maíz, melón, patata, pinos, platanos de sombra, solanáceas, vid y champiñón.
- 7 días en alcachofa, alfalfa, cereales, escarola, espinacas, frutales, higuera, hortalizas de bulbo, brassicas, lechuga, hierbas aromáticas, olivo y puerro.
- 35 días en algodónero, citricos, colza, girasol, lúpulo, remolacha y tabaco.