

Composición: tebuconazol 25 % p/v (250 g/l).
Formulación: Emulsión de aceite en agua (EW).
Presentación: Frascos de 250 cc y 1 l.

Características

Folicur es un fungicida de amplio espectro de acción y propiedades sistémicas. Se caracteriza igualmente por su efecto no sólo preventivo sino también curativo y erradicante.

Usos autorizados

Tratamientos fungicidas en cultivos de:

Vid, contra oídio y botritis.

Trigo y cebada, contra oídio, roya, septoria y helmintosporium

Arroz, contra piricularia y helmintosporium.

Ajos, berenjena y cebolla, contra botritis, roya, esclerotinia y cladosporiosis.

Calabacín, pepino, pimiento y tomate, contra botritis, esclerotinia y cladosporiosis.

Judías verdes, contra botritis, esclerotinia y roya.

Dosis y modo de empleo

Aplicar en pulverización normal a la dosis de 0,04-0,1 %.

En trigo y cebada, aplicar a 1 l/ha y en ajos y cebollas a 2 l/ha, realizando la aplicación inmediatamente después de la siembra en pulverización al suelo o incorporándolo en el agua de riego.

Plazo de seguridad

Entre el último tratamiento y la recolección:



3 días en ajos, cebollas, berenjena, calabacín, pepino, pimiento y tomate.

14 días en judías verdes.

21 días en vid.

35 días en arroz, cebada y trigo.

Observaciones

No se descarta la posibilidad de aparición de hongos resistentes, lo cual no es fácil prever debido a los múltiples factores de influencia, por lo que se recomienda alternar los tratamientos con fungicidas de distinta naturaleza.

Clasificación Toxicológica				
General	Mamíferos	Aves	Peces	Abejas
Noctuo (Xn)	A	A	A	Peligrosidad controlable

Nº de Registro: 18.640