

**Composición:** metiocarb 4 % p/p (40 g/kg).

**Formulación:** Cebo en gránulos (GB).

**Presentación:** Bote de 400 g, bolsa de 1 kg y saco de 5 kg.

## Características

Insecticida-helicida formulado con una sustancia atrayente especial que garantiza la ingestión del preparado.

## Usos autorizados

Tratamientos insecticidas en **todas las especies vegetales de regadío, invernaderos y arbustos ornamentales**, contra caracoles, babosas, artrópodos e insectos del suelo.

## Dosis y modo de empleo

Esparcir el producto uniformemente sobre el suelo a la dosis de 3 a 4 kg/ha, evitando que caiga sobre los cultivos.

Es aconsejable aplicar el producto al atardecer y repetir el tratamiento si al día siguiente se observa que todo el preparado ha sido ingerido, en caso de ataques intensos.

## Plazo de seguridad

Entre el último tratamiento y la recolección:  
15 días en todos los cultivos.



## Observaciones

Los cultivos muy rentables pueden ser protegidos mediante franjas cebo de 1-2 m. de ancho, dosificando a 1-3 g/metro lineal.

Resulta también ventajoso tratar los semilleros de hortalizas y de flores, así como las cajoneras e invernaderos, tratando en estos también las partes situadas debajo de las mesas de trabajo

Clasificación Toxicológica				
General	Mamíferos	Aves	Peces	Abejas
Noctuo (XII)	C Muy peligroso	C Muy peligroso	B Mediana peligrosidad	

Nº de Registro: 15.771